



Information inför steloperation i ländrygg med främre snitt



SportsMed, Carlanderska sjukhuset
www.sportsmed.se info@sportsmed.se 031-818083



Ryggen

Ryggen är uppbyggd av kotor och mellan kotor finns det skivor som kallas diskar. Från varje kotkropp utgår en kotbåge bakåt, med små leder på var sida, sk facettleder, som hjälper till i rörelser mellan kotorna. Förutom kotor och facettleder finns ledband, muskler och senor som stabiliserar och möjliggör rörelser i ryggen.

Segmentell rörelsesmärtas i ländryggen

Steloperation eller fusion av ländryggen utförs på grund av långvarig rörelse- och belastningsutlöst smärta i ländryggen (segmentell rörelsesmärtas/SRS), där smärtan bedömts vara kopplad till degeneration (tidigt åldrande) av en eller flera diskar mellan kotorna (bild 2). På magnetkameraundersökningar syns detta som mörka och låga diskar (bild 1).



Bild 1.




Bild 2. A, Normal disk B, Ihoptryckt disk C, Bensporrar



Steloperation i ländrygg med främre snitt

Ingreppet innebär att man går in framifrån via buken (ALIF) eller från sidan (XLIF/LLIF) utanför bukhinnan fram till ryggraden.

Operationssnittet kan vara längsgående eller tvärgående (bild 5). Den degenererade disken avlägsnas och ersätts med en bur antingen av metall (bild 6) eller plast, så kallad PEEK (bild 7). Buren packas med ben som tas från höftkammen alternativt benersättningsmaterial och placeras på platsen för disken mellan kotorna. Buren skruvas sedan fast i kotroppen ovan och nedan med titanskruvar. Det innebär en stabil fixation av det segmentet i ryggen i väntan på att kotropparna skall växa ihop.

I och med att man skruvar fast kotroppar med varandra kallas detta för steloperation eller fusion med fixation. Fördelarna med främre ingrepp är att man inte påverkar ryggmuskulaturen, snabb återhämtning och läkning, mycket låg risk för infektion och nervskada samt samtidig korrektion av ryggens hållning.



Bild 3. Röntgenbild efter operation med ALIF



Bild 4. Röntgenbild efter operation med XLIF



Bild 6. Metallbur



Bild 7. PEEK bur




Bild 5. Olika hudsnitt för främre ländryggskirurgi



Prognos

Det är cirka 70 % chans att du får en förbättring i din ryggsmärta, men det går inte att helt garantera att du blir smärtfri. Risken att du har oförändrade besvär efteråt är cirka 10–15% och risken att du upplever dig försämrad är cirka 5%.

I några få procent av fallen läker inte steloperationen och sammanväxningen av kotkropparna uteblir. Man kan då behöva gå vidare och fullborda steloperationen med bakre ryggingrepp. Riskfaktorerna för utebliven läkning av steloperationen är tidigare ryggkirurgi, rökning, övervikt och att flera nivåer som stelopereras vid samma tillfälle.

Inför operationen är det viktigt att du är aktiv och i god kondition, vi ser gärna att du med stöd av fysioterapeut har utfört förberedande träning, detta brukar underlätta rehabiliteringen efteråt. Det förekommer att man får tillfälligt mer ont under och efter aktivitet. Lyssna på smärtan och anpassa aktiviteten utefter den.

Risker

Risk för komplikationer finns vid alla ingrepp, även ryggoperation. Även om riskerna är små, så finns inga garantier mot komplikationer.

Allmänna risker vid ryggoperationer är:

- Infektion, 1 %. Detta motverkas med antibiotikaproylax (vilket alla får i samband med operationen).
- Blodpropp i benet, 0.1–1%. Detta motverkas med proppförebyggande medicin, tidig uppstigning efter operationen samt fot- och benrörelser vid sängläge.
- Stor blödning pga. kärlskada, 1 %.
- Nervpåverkan, 2–3%.

Risken för dessa komplikationer vid steloperation med främre ingrepp, dvs. via magen, förefaller betydligt lägre förutom risken för blodproppar. Nervpåverkan i ryggmärgskanalen är mycket ovanlig, men kan ge symptom av töjning av nerver när en disknivå som länge varit låg återfår normal höjd. Om dessa symptom uppträder brukar de gå tillbaka inom en till två månader.

Vid främre ingrepp finns en risk för påverkan av det så kallade sympatiska nervsystemet (cirka 5 %), vilket löper i tunna trådar på höger och vänster sida av främre kotpelaren. Dessa nervtrådar kan töjas under operationen eller påverkas av svullnad efter operationen. Vanligast märks påverkan på det sympatiska nervsystemet t.ex. på att en fot blir varmare än den andra samt att man inte svetts om den varma foten. Dessa symptom brukar vara övergående men kan ta lång tid från ett par veckor till flera år.

En annan komplikation kan vara så kallad retrograd ejakulation, där sädesvätskan går bakåt in i urinblåsan. Denna risk är mindre än 1 % och kan ta månader eller år för återhämtning.



Inför din operation ber vi dig följa nedanstående instruktioner noggrant

Du måste vara fastande: 6 timmar innan du ska vara på sjukhuset får du inte äta någon fast/halvfast föda, röka eller snusa. Du får gärna dricka klar vätska såsom vatten, kaffe, te och saft (ej mjölkprodukter) fram till 2 timmar innan du ska vara på operationsavdelningen.

Raka **inte** operationsområdet veckan innan operationen pga risken för att små sår kan uppstå. Dessa kan orsaka infektion vid operationen. **Det är viktigt att Du inte har några sår på kroppen inför din operation.**

Dubbelduscha med Descutan 3 gånger vilket är svampar med bakteriedödande tvål. Du måste tvåla in hela kroppen och håret **2 gånger vid varje duschtilfälle.** Detta är mycket viktigt så att du inte ska få sårinfektion. Om du inte har duschat enligt dessa instruktioner kommer din operation att skjutas upp. Tvålen finns att köpa på valfritt apotek.

1. Första dubbelduschen görs dagen innan operation på eftermiddagen.
2. Andra dubbelduschen görs dagen innan operation på kvällen (minst 2 timmar efter första dusch).
3. Tredje dubbelduschen görs **på** operationsdagens morgon.

Så här gör du

Ta av ev. smycken och klocka. Duscha hela kroppen och håret med vatten. Tvåla in hela kroppen, och även håret med tvättsvampen 2 gånger vid varje dusch tillfälle. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig. Börja uppfifrån och tvätta nedåt. Tvållösningen ska sitta kvar ca 2 minuter innan den sköljs av. Ta ny svamp till varje tvagning/tvättning och ren handduk efter varje dusch tillfälle. Akta ögon och öron (skydda med bomull/fetvadd i öronen), lösningen kan reta slemhinnor.

Byt till rena kläder efter varje dusch. Bädda rent i sängen. Smörj **inte** in dig med hudkräm efter duscharna.

Att tänka på inför operation

- Använd **inte** hudkrämer eller andra kosmetiska produkter.
- Avlägsna make-up, nagellack samt piercing. Lämna smycken och värdesaker hemma.
- Om du står på regelbunden medicinering, var vänlig ta med dessa.
- Om du äter blodförtunnande medicin som Waran, Eliquis, Plavix, Pradaxa, Xarelto, Efient eller Brilique måste detta sättas ut enligt schema.
- Om du står på antiinflammatoriska läkemedel såsom Arthrotec, Baml, Brufen, Celebra, Diklofenak, Ipre, Magnecyl, Orudis, Voltaren och Treo ska dessa sättas ut 2 dagar före operation då de kan ge ökad blödning under operationen.
- Du kan oftast ta smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol eller Citodon, men diskutera detta med din kirurg när ni planerar operationen.
- Du får vanligtvis insatt en urinkateter före operation.

Nikotin

Om du använder nikotin såsom vid rökning, snusning, nikotinplåster skall du sluta med dessa 6 veckor före operation och vara nikotinfri minst 6 veckor efter operation. Nikotin medför stora risker. Kroppens vävnader får mindre syre, benläkningen hämmas, operationssåret läker långsammare och risken för infektion ökar. Risken för att steloperationen misslyckas är 40% hos rökare jämfört med 8% hos icke rökare.

OBS! Var god **medtag fotolegitimation**. Annars kan inte operationen genomföras. Tänk på att klä dig i rymliga kläder för att lättare kunna klä på dig efter operationen!

Efter operation

Vårdtiden på avdelningen är 1 dygn. De första timmarna ligger du på en uppvakningsavdelning där du får ligga på rygg eller på sidan. Redan på operationsdagen kommer du att få hjälp att komma igång att stå och gå.

Du får röra dig helt fritt med den naturliga begränsningen som sårsmärtan ger. Värktabletterna är till för att motverka sårsmärta. Promenader i korridoren ser vi som en del av din träning och det underlättar för att få igång magen. Du kommer också få instruktioner i det första träningsprogrammet som du får med dig hem.

Du får börja dricka och äta så snart du vill efter operationen. Det kan dock dröja några dagar innan magen kommer igång för fullt igen. Var uppmärksam på din kosthållning under denna tid. En urinkateter sätts in under operationen och den kommer du att ha kvar till morgonen efter operationen. Innan hemgång kommer en kontrollröntgen att göras (bild 3 och 4).



Besökstider: För aktuella besökstider på avdelningen kontakta vårdavdelningen 031 - 81 81 00.

Hemtransport: Du behöver ordna med någon typ av hemtransport då du inte kommer att kunna köra hem själv. I normalfallet går det bra att bli skjutsad i personbil även längre sträckor. Om du planerar att åka buss eller tåg rekommenderar vi att du har någon som åker med dig. Om du har problem att ordna med hemtransport ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta. Vid hemresa i personbil rekommenderas en något bakåtlutad position i framsätet i personbil.

Sårvård: Förbandet inspekteras innan du åker hem. Förbandet är täckt med ett vattenavisan- de plåster, så du kan duscha som vanligt så länge förbandet är helt och tätt. Om det kom- mer in vatten under plastfilmen måste förban- det bytas. Förbandet ska om möjligt sitta orört i två veckor och kan därefter avlägsnas ihem- met. I de flesta fall är såret sytt med fortlöpan- de stygn, och då vanligen med "resorberbar tråd" som inte behöver tas bort, i annat fall med agraffer (häftklamrar av metall) som ska tas bort. Information om detta medföljer en remiss som du tar med till distriktssköterskan för borttagning av stygn eller agraffer. Om du får feber, allmän sjukdomskänsla, vätskande sår, ökade smärtor i operationsområdet eller nyttillkommen bensmärta hör du av dig till oss på SportsMed, tel. 031-81 80 83.

Restriktioner: Undvik kraftig bakåtböjning (bild 8) vilket även sker när du svankar (bild 9). Du kommer att få instruktioner och träning i att bibehålla en neutral hållning (bild 10 och 11). Vi rekommenderar att du undviker tunga lyft de första 12 veckorna efter operation.



Bild 8.



Bild 9.



Bild 10.



Bild 11.

Aktivitet: Det är inte farligt att det gör ont när du rör dig och tränar. För att hjälpa ryggen till bästa läkning och återhämtning är det gynnsamt att komma igång och röra dig måttligt och växla ställning regelbundet. Du bör så snart som möjligt återgå till normala vardagsaktiviteter. Du får alltså gå, stå, sitta, cykla, åka buss och tåg så snart du själv vill och känner att du klarar det. Du kan sitta kortare stunder i kombination med att du är uppe och går samt ligger ner och vilar. Att sitta under längre perioder ökar belastningen på ryggen, främst i djupa sittställningar som i mjuka soffor. Du bör undvika att köra bil så länge du är påverkad av starka värktabletter.

Vi rekommenderar dagliga promenader som du successivt ökar i längd. Börja t.ex. med 10 minuter och öka sedan tiden successivt om du inte får mer värk efteråt. Ta hellre flera korta promenader än en lång. Utöver promenaderna skall du också utföra träningsprogrammet som du fått efter operationen.

Rehabiliteringen är initialt inriktad på att träna upp ryggens funktion och därmed underlätta återgång till aktiviteter i det dagliga livet. Därefter övergår rehabiliteringen till upptrappande träning för rörlighet, styrka/bålsta-bilitet och koordination. Du kommer också att få hjälp med att träna upp en gynnsam hållning. Rehabiliteringen är individuellt anpassad. Det är viktigt att du själv är aktiv och tar ansvar för din rehabilitering.

Hjälpmedel som ett långt skohorn och en griptång kan för vissa patienter underlätta vardagen den första månaden.

Sjukskrivningstiden beror på hur snabbt smärtan försvinner efter operationen samt på vilken typ av arbete du har. Återgång till arbete planeras i samråd med din operatör. Om du har kontorsarbete kan du börja arbeta deltid redan efter 1–2 veckor, hemifrån oftast tidigare. Om du har ett tyngre arbete rekommenderas du sjukskrivning ca 12 veckor på heltid och sedan 4 veckor på deltid.

Flygresor: Har Du en flygresor inplanerad de närmaste 3 veckorna efter operationen, hör av dig till oss. Tänk på att flygresor alltid innebär en ökad risk för blodpropp. Därför rekommenderar vi dig att alltid använda stödstrumpor vid flygresor.

Smärtlindring

Operationen medför smärta från sårskadan i magmusklerna. För att du skall kunna komma igång och röra dig är det viktigt att dessa smärtor inte blir för stora, balanserad smärtstillande medicinering på sjukhuset är därför viktig. Det bedövningsmedel som lagts kring operationssåret under operationen ger viss hjälp första dygnet. Även efter utskrivningen kommer du att ha en viss smärta, vilket är naturligt eftersom du har ett sår som ska läka. Du kommer därför att få recept på smärtstillande läkemedel innan hemgång.

Allteftersom smärtan avtar under de första en till två veckorna kan du minska och slutligen sätta ut värktabletter. Du kommer också få ett recept på 10 sprutor med blodproppförebyggande innehåll som ska tas 1 gång/dag.




Träningsprogram efter ALIF

Ska utföras 2-3 ggr/dag tills återbesöket hos Fysioterapeut som är efter ca 2-3 veckor



- 1 Aktiver bålmsklerna genom att dra in/ner magen. Håll kvar några sekunder, släpp. Upprepa 2x10.



2. Aktivera bålmsklerna som ovan. Pressa ned svanken, tryck ena handen och motsatt sidas fot mot underlaget. Håll några sekunder. Byt sedan hand/fot. Upprepa 2x10.



3. Tåhävningar, gå upp och ner på tå. Upprepa 2x15.



4. Aktivera bålen – stå på ett ben och håll balansen. Byt ben. Upprepa 2x30 sek per ben.



- 5 Drag mjukt båda benen upp mot bröstet tills du känner en lätt töjning i ryggen. Upprepa 2x10-15 sek.



6. Luta dig lite fram och behåll rak rygg. Gör en knäböjning med en stol bakom dig. Upprepa 2x10.

Återbesökstider:

Boka tid till sjuksköterska 2 veckor efter operation för sårkontroll. Besöket bokas hos distriktssköterska på hemorten eller på SportsMed.

Boka tid till fysioterapeut 2 veckor efter operation. Vi rekommenderar att du bokar in denna tiden då du fått tid för din operation. Tiden bokas på SportsMed eller hos annan fysioterapeut.

Boka återbesök/telefonid till opererande läkare enligt överenskomelse med din operatör.

Boka tiderna på SportsMed på 031-818083 (knappval, välj sjuksköterska) eller maila på info@sportsmed.se.



Checklista inför operation:

☐ Boka tid till fysioterapeut 2 veckor efter operation.

☐ Slutat med läkemedel enligt rekommendation.

Läkemedel: _____

☐ Antibakteriell dusch har genomförts enligt ovan ordination och den 3:e gjord **PÅ** operationsdagen.

☐ Inga sår eller hudkräm.

☐ Fastande enligt rekommendation.

☐ Hemtransport ordnad.

☐ Ta med rena, rymliga kläder som är lätta att ta på samt bra skor att gå i.

☐ Detta häfte tas med till sjukhuset.

Din operation är planerad till _____ dag /

Vid frågor inför din operation:

Ring operationskoordinator 031 - 81 80 76.

Telefontider: Mån – fre kl 8.00-10.00, 13.00 – 15.00.